


PAPILIÓNIDOS (LEPIDOPTERA: PAPILIONIDÆ) DE VENEZUELA

*Protesilaus telesilaus telesilaus*  
(FELDER & FELDER, 1864)



*Protesilaus aguiari*  
(D'ALMEIDA, 1937)



*Protesilaus telesilaus telesilaus*

(FELDER & FELDER, 1864)

AMAZONAS · BOLÍVAR

Esta especie se diferencia de otras similares porque la cuarta banda negra en el ala anterior está reducida a una pequeña mancha en el borde anterior del ala, pero sobre todo tiene tres lunares netamente amarillos en la hilera interna, cerca de la cola, en el ala posterior. Estos lunares son de color amarillo pálido o blancos puros en otras especies similares. La larva u oruga de esta mariposa se alimenta de hojas de Annonaceae (familia del guanábano) y Lauraceae (familia del aguacate) silvestres. En Venezuela esta especie es común en los estados Amazonas y Bolívar, pero se encuentra incluso hasta el centro de Brasil y al norte de Bolivia.

*Protesilaus aguiari*

(D'ALMEIDA, 1937)

AMAZONAS · DELTA AMACURO

A pesar de que esta especie es localmente común en los estados Amazonas y Delta Amacuro, muy poco se sabe de su biología. Su larva no ha sido descrita y no se conoce su planta hospedera.