




CALLICORE DE VENEZUELA

Callicore astarte staudingeri



Callicore texa texa



Callicore astarte staudingeri

(DILLON, 1948)

ZULIA hasta YARACUY · CORDILLERA DE LA COSTA

Esta es la subespecie de la cuenca del lago de Maracaibo, de donde su área de distribución se extiende hasta el estado Yaracuy y la cordillera de la Costa. Se ha observado en el Parque Nacional Henri Pittier, donde es muy rara. El macho se diferencia de *Callicore astarte astarte* en que la banda roja del ala posterior es muy corta y el fondo negro tiene un fuerte tinte violáceo oscuro. Las hembras de las dos subespecies son similares.

Callicore texa texa

(HEWITSON, 1855)

TÁCHIRA · ZULIA · YARACUY · ARAGUA

De amplia distribución que abarca la región comprendida entre Táchira, Zulia, Yaracuy y Aragua, esta subespecie es sin embargo mucho menos común que *Callicore pitheas*.

En el oriente y sur del país encontramos otras subespecies de *Callicore texa*. Los sexos son similares. La mariposa puede ser observada en caminos que atraviesan bosques deciduos, a veces en la cercanía de un río, pero su presencia es impredecible y generalmente no vuela más de un solo ejemplar en un mismo lugar. Las plantas hospederas de la larva son lianas de los géneros *Cardiospermum*, *Paullinia* y *Serjania*, todas pertenecientes a la familia Sapindaceæ.